



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДОРМИКИНД DORMIKIND

Торговое название препарата: Дормикинд

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка (100 мг) содержит:

активные вещества: Cypripedium pubescens trit. D4 15 мг, Magnesium carbonicum trit. D10 20 мг, Zincum valerianicum trit. D12 15 мг;

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

Описание: белые или почти белые, двухплоскостные таблетки со скошенной гранью.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатические средства.

Фармакологические свойства

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины в смысле понимания болезни и применения лекарственных субстанций. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные силы организма, активируя тем самым его способность к самоизлечению. Ответ организма на гомеопатическое средство высокодивидуален. По этим причинам оказывается невозможным определение доза-специфических эффектов, а также фармакодинамических или фармакокинетических данных.

Показания к применению

Для лечения беспокойства и нарушений сна у детей грудного и младшего возраста.

Способ применения и дозы

Детям до 6 лет по 1 таблетке до 4 раз в день.

Дормикинд не рекомендуется принимать вместе с едой и напитками. Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. При необходимости таблетки можно растворять в небольшом количестве воды.

Не рекомендуется давать двойную дозу, чтобы возместить пропущенный приём препарата.

Побочные действия

До настоящего времени неизвестны. Если вы думаете, что у вашего ребенка после приёма препарата появляются какие-либо побочные эффекты, проинформируйте Вашего врача.

Противопоказания

Гиперчувствительность к препарату.

Лекарственные взаимодействия

До настоящего времени неизвестны. Если ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства, проинформируйте Вашего врача.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение симптомов заболевания. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Если Вы заметите, что Ваш ребёнок недостаточно отвечает на Дормикинд, или у него появляются непредвиденные симптомы, обратитесь, пожалуйста, к врачу.

В данном лекарственном средстве содержится лактоза (молочный сахар). Если Ваш врач сказал Вам, что у Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с ним до применения лекарственного средства.

Препарат не следует применять после истечения срока годности.

Передозировка

До настоящего времени неизвестны.

Форма выпуска

По 150 таблеток в стеклянном флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.

Условия хранения

Не требует особых условий.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Название и местонахождение производителя и владельца регистрационного удостоверения:

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Узбекистан, 100041, г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Навнихол 86

Тел.: +99871 230 91 93

email: intopharm@zoho.com