



ҚҮЛЛАШ БҮЙИЧА ЙЎРИҚНОМА ГАСТРИТОЛ GASTRITOL

Препаратнинг савдо номи: Гастритол

Дори шакли: Перорал томчилар

Таркиби

100 мл препарат қуйидагиларни сақлайди:

Фаол моддалар: ғозпанжа ўтининг суюқ экстракти (*Anserinae herba*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40% (хажм/хажм)) 35 мл, мойчечак гулларининг суюқ экстракти (*Matricariae flos*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 45 % (об/об)) 20 мл, қизилмия илдизининг суюқ экстракти (*Liquiritiae radix*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (хажм/хажм)) 15 мл, ойболтиргон илдизининг суюқ экстракти (*Angelicae radix*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (хажм/хажм)) 5 мл, кардобенедикт ўтинининг суюқ экстракти (*Cnici ben. herba*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (хажм/хажм)) 5 мл, аччиқ эрмон ўтнинг суюқ экстракти (*Absinthii herba*) (1:1,7-2,2) (экстрагент: этанол 40 % (хажм/хажм)) 5 мл.
боиша ингредиентлар (тўлдирувчилар): этанол 96 % (хажм/хажм), тозаланган сув.

Таърифи: Тиниқ жигар ранг суюқлик.

Фармакотерапевтик гурухи: Меъда-ичак йўлларининг патологиясини даволаш учун воситалар.

АТС коди: A03A X.

Фармакологик хусусиятлари

Препарат меъда-ичак йўлларида махаллий самара чакиравчи, шунингдек меъданинг секретор ва мотор фаолиятинига марказий таъсир кўрсатувчи қуйидаги фаол моддаларни сақлайди

Potentilla anserinum (ғозпанжа) меъда-ичак йўлларининг мушакларига спазмолитик таъсир кўрсатади.

Licorice root (қизил мия илдизи) глицирризин кислотаси сақлайди, у кучли яллиғланишга карши таъсирга эга ва грануляцион тўқиманинг хосил бўлишини рағбарлантиради, шунингдек меъда-ичак йўлларининг тонусини ва моторикасини пасайтиради (спазмолитик самара). Меъда шиллик қаватининг ваккуляризацияси ошади. *Matricariae* (доривор мойчечак) яллиғланишга карши, аллергияга карши ва регенерацияловчи самара кўрсатади.

Хамазулен шиллик қаватига тез ва чукур киради. Гипофиз-адренал тизимининг фаоллашиши кортикотропин ва кортизонни кучли ажralиб чикишига олиб келади. Яллиғланишга карши ва аллергияга карши таъсирга, шунингдек β -фарнезен ва α -бисаболол ҳам эга. *Carduus benedictus* (кардобенедикт) аччиқ гликозид кницин сақлайди, у *Angelica root* (дягеле) да сақланадиган аччиқлар каби, меъда-ичак йўллари аъзоларини қон билан таъминланишини яхшилайди ва шу билан меъданни шиллик қаватининг яралари ва шикастланишларининг битишини тезлаштиради. Аччиқ модда *Absinthii herba* (аччиқ эрмон) каскадли меъда тонусини оширади ва гастрокардиал синдромининг белгиларини яхшилайди..

Қўлланилиши

Функционал диспепсия, метеоризм, гастритлар, жумладан сурункали гиперацид гастрит,

хамда меъда ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллигини мажмуавий даволаш таркибида қўлланади.

Кўллаш усули ва дозалари

Бошқача буюришлар бўлмаса оз микдордаги суюқликда эритилган 20 – 30 томчидан кунига 3 марта, овқатланиш вақтида қабул қилиади. Оғир ва ўткир ҳолатларда ҳар 30 минут 1 соатда 15 -25 томчидан қабул қилинади. Худди шундай даволаш схемаси такрорий даволашда қўлланади.

Даволашнинг давомийлиги – 3 -4 хафта. Зарурати бўлганида даволаш курсини 2 ойдан кейин такрорлаш мумкин.

Ножўя таъсири

Жуда кам ҳолларда териси ёруғликка жуда юкори сезувчан пациентларда жадал қуёш нурлари таъсири остида ривожланадиган қуёшли куйиш тури бўйича тери реакциялари пайдо бўлиши мумкин.

Препаратнинг алоҳида компонентларини шахсий ўзлаштираолмаслик хақида адабиётларда аллергик реакциялар таърифланган (терини қизариши, тошмалар, кичишиш) реакциялар, меъда-ичак тизими томонидан (кўнгил айниши, қусиш) реакциялар, сув-электролит балансининг бузилишлари.

Аммо Гастритол препарати қўлланганда бундай ножўя реакциялар хақида маълумотлар тушмаган.

Кўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг қандай бўлмасин ингредиентларидан бирига юкори сезувчанлик, препаратнинг компонентларига аллергик реакциялар.

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири

Хозирги вақтгача номаълум..

Махсус қўрсатмалар

Гастритол 40 хажм % этанол сақлайди.

Препарат йўриқномага мувофиқ қабул қилинганида ҳар бир дозада (25 томчи) 0,4 г спирт қабул қилинади, бу жигар касаллиги, марказий нерв тизимининг шикастланиши, алкоголизм, тутканоги булган пациентлар, ҳомиладор аёллар ва болалар соғлиги учун хавф туғдириши мумкин. Бошқа дори воситаларнинг таъсири камайиши ёки кучайиши мумкин.

Заррачалар пайдо бўлиши ёки хиралashiши, салбий самара чакирмайдиган ва бу препаратнинг самарадорлигини камайтиrmайдиган, ўсимликлар асосида тайёрланган препаратларнинг суюқ шаклларида кузатилади.

Алоҳида огоҳлантиришлар

1 томчи препарат 0,016 г этанол сақлайди.

Ҳомиладорлик ва эмизиш

Бундай ҳолларда препаратни қўллашни етарли тажрибаси бўлмаганлиги туфайли, препаратни аёлларда ҳомиладорлик ва эмизиш даврида қўллаш мумкин эмас.

Автотранспортни ҳайдаш ва махсус мосламалар билан ишлаш қобилиятига таъсири
Терапевтических дозалар диапазонида препаратни қўллаш, автотранспортни бошқариш ва бошқа механизmlар билан ишлашга таъсир қилмайди.

Болалар

Болаларда қўллаш тажрибаси етарли бўлмаганлиги туфайли, препаратнинг 12 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

Дозани ошириб юборилиши

Препаратнинг дозаси тасодифан ошириб юборилганида одам соғлиғи учун хавф эхтимоли йўқ, шунинг учун ҳеч қандай маҳсус чоралар кўриш керак эмас.

Чиқарилиш шакли

Перорал томчилар.

20 мл, 50 мл, 100 мл дан флаконларда томчилагич билан; 1 флакондан қўллаш бўйича йўрикномаси билан бирга картон кутида..

Сақлаш шароити

Оригинал ўрамда 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар олаолмайдиган жойда сақлансин.

Флакон очилгандан кейин сақлаш муддати – 3 ой.

Яроқлилик муддати

3 йил.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилик муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany