



ҚҮЛЛАШ БҮЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

ПРОСПАН®
PROSPAN®

Препаратнинг савдо номи: Проспан®

Таъсир этувчи модда: Печак баргларининг қуруқ экстракти

Чиқарилиш шакли: Ичга қабул учун томчилар, 20 мл дан тикин – томчилагич ва бураладиган копқоқ билан таъминланган тўқ шиша флаконларда. Ҳар бир флакон қўллаш бўйича йўриқномаси билан картон қутига жойланган.

Таркиби

1мл препарат сақлайди:

Фаол модда: печак баргларининг қуруқ экстракти (5-7, 5:1) - 0,02 г

Ёрдамчи моддалар: тозаланган сув, натрий сахаринати, 96% этанол, арпабодиён мойи, укроп мойи, ялпиз мойи.

Таърифи: тўқ-жигарранг рангли спирт ва укроп хидли суюқлик. Сақлаш жараёнида бироз хирадашиши ва чўкма ҳосил бўлиши мумкин.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Балғам кўчирувчи воситалар.

Фармакологик хусусиятлари

Ўсимликлардан олинадиган препарат. Балғам кўчирувчи, муколитик ва спазмолитик таъсир кўрсатади. Балғамнинг ковушкоклигини камайтиради ва унинг кўчишига ёрдам беради.

Қўлланилиши

Препарат юқори нафас йўллари ва ўпканинг йўтал ва балғамни ажралишини бузилиши билан кечувчи яллиғланиш касалликларини даволашда, балғамни кўчирувчи восита сифатида ишлатилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Препарат ичга қабул қилинади. 1 – 3 ёшли болаларга 10 томчидан кунига 3 – 5 марта. 4 – 7 ёшли болаларга 15 томчидан кунига 3 – 5 марта; мактаб ёшидаги болаларга ва катталарга – 20 томчидан кунига 3 – 5 марта;

Томчиларни овқат қабул қилишдан олдин қабул қилиш лозим. Кичик болаларга томчиларни оз микдордаги сув билан бериш тавсия қилинади.

Даволаш қурси касалликни кечиши оғирлигига қараб шифокор томонидан белгиланади, Минимал даволаш қурси 1 ҳафтани ташкил қилиши керак. Терапевтик самарани мустаҳкамлаш учун касаллик белгилари йўқолганидан кейин, даволашни яна 2 – 3 кун давомида давом этириш тавсия қилинади. Терапевтик самара бўлмаганида шифокорга мурожаат қилиш керак.

Ножӯя таъсирлари

Аллергик реакциялар бўлиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг компонентларига юқори сезувчанлик, болалик ёши (1 ёшгача), алкоголизм ва алкогольни алкоголь сақловчи препаратларни қабул қилиш мумкин бўлмаган бошқа ҳолатлар.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Препаратни бир вактда йўталга қарши дори воситалари билан қўллаш мумкин эмас, чунки бу суюлган балғамни йўтал билан чиқарилишини қийинлаштиради.

Махсус қўрсатмалар

Препарат 47 ҳажм % алкогол сақлайди.

Қанд, консервантлар ва бўёвчи моддаларни сақламайди. Сақлаш жараённида суюкликни бироз хирадашибиши, унда чўкма ҳосил бўлиши ва таъми аҳамиятсиз ўзгариши мумкин, бу препаратнинг терапевтик самарасига таъсир қилмайди.

Проспан® томчиларини қўллаш билан ингаляцион даволаш.

Проспан® томчилари билан ингаляцияни ўтказиш учун барча стандарт курилмалар ва иситишсиз пуркаш учун асбоблар яроқлидир. Препаратда алкогол сақланганлиги туфайли, ножёя самараларини олдини олиш учун, Проспан® ни ингаляция учун ичимлик суви билан 1:2 нисбатда суюлтириш мумкин.

Махсус ингаляцион асбобга 20 – 25 томчи препарат томизилади ва хона ҳароратидаги ичимлик суви билан 1:2 нисбатда суюлтирилади. Ингаляциялар кунига 3 – 5 марта ўтказилади.

Ҳомиладорлик ва лактация вактида қўлланиши

Препаратни ҳомиладорлик ва эмизиш даврида қўллашнинг мумкинлигини аниқлаш мақсадида текширишлар ўтказилмаганлиги туфайли, препаратни факат шифокор билан олдиндан маслаҳатлашиб қўллаш мумкин.

Препарат болалар олаолмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дозани ошириб юборилиши

Кундалик буюрилган дозадан аҳамиятли юкори (3 мартадан ортик) дозани қабул қилиш кўнгил айниши, қусиши ва диареяни чакириши мумкин. Бундай ҳолларда пациент шифокорга мурожаат қилиши керак.

Сақлаш шароити

25°C юкори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Яроқлилик муддати

4 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

Энгельгард Арцнаймиттель ГмбХ&Ко КГ.,
Херцбергштрассе, 3, Д – 61138 Нидердорфелден, Германия