

ҚҮЛЛАШ БҮЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

ТРАХИСАН

TRACHISAN

Препаратнинг савдо номи: Трахисан

Таъсир этувчи моддалар: Тиротрицин, лидокаин гидрохлориди, хлоргексидин диглюконати.

Чиқарилиш шакли: Шимиш учун таблеткалар. Ўрамда 20 таблеткадан (10 таблеткадан блистрлар).

Таркиби

1 таблетка сақлайди:

Фаол моддалар: тиротрицин-0,5 мг, лидокаин гидрохлориди-1 мг, хлоргексидин диглюконати-1 мг;

Ёрдамчи моддлар: сорбитол (Е 420), магний стеарати, ялпиз мойи.

Фармакотерапевтик гурухи: ЛОР аъзоларини даволаш учун воситалар.

Фармакологик хусусиятлар

Препарат микробларга қарши ва маҳаллий анестезияловчи хусусиятларга эга бўлган моддалар мажмуасини сақлайди.

Тиротрицин бактериал хужайралардан азот ва фосфор сақловчи субстанцияларни ажralиб чиқишини чақиради, улар катион детергентларга ўхшаб, бактериал хужайра мемранасининг осмотик тўсигини бузади. Тиротрицин ўсувчи ва бўлинувчи микроорганизмларга бактерицид таъсир қиласи. Грамицидин бактерияларнинг хужайра мемранасида катион ўтказувчи каналлар ҳосил қиласи, бу хужайра ички катионларнинг концентрациясини ўзгаришига ва цитолизга олиб келади. Тиротрициннинг таъсир доираси граммусбат коклар, бактериялар ва *Candida albicans* дан ташқари турли замбуруғларини ўз ичига олади. Антибиотиклардан фарқли равишда, тиротрицин қўлланганида микрорганизмларнинг қарама-қарши резистентлиги кузатилмайди. Бу хусусияти тиротрициннинг таъсир механизми билан боғлик.

Хлоргексидин ва унинг тузлари граммусбат ва грамманфий бактерияларга қарши яққол микробларга қарши таъсирга эга.

Хлоргексидиннинг таъсир механизми микроорганизмларнинг хужайра қобиги билан унинг яқинлигига асосланган, унинг хусусиятлари фаол модда билан тўқнашганидан кейин ўзгаради. Хлоргексидиннинг липофил гурухлари хужайра қобигининг липопротеин мемранасини дезагрегациясига олиб келади, хужайраларда осмотик мувозанатини бузади, бу қўзгатувчининг хужайрасини цитоплазматик мемранасини бузади.

Лидокаин гидрохлориди амид тури маҳаллий анестетикдир. Препарат нерв толаларининг натрий каналларини блокадасини чақиради, бунинг оқибатида фаол потенциал орқали нерв хужайраси мемранасини деполяризацияси жараёни бузилади. Бунда сезувчи нерв толаларида қўзгалувчанликни ўтиши блокланади.

Фармакокинетикаси

Маълумотлар йўқ.

Қўлланилиши

Стоматитлар, гингивитлар, пародонтитлар, глосситлар, тонзилитлар, фарингитлар каби оғиз бўшлиғи ва томоқнинг яллиғлааниш ва инфекцион касалликлари ва ютишнинг бузилиши билан бирга кечувчи бошқа ҳолатлар. Оғиз бўшлиғи ва томоқ соҳасидаги хирургик аралашувларидан олдин инфекцияларни олдини олиш учун (тиш экстракцияси, тонзиллэктомия) қўлланади.

Құллаш усули ва дозалари

Бир таблеткадан оғизда шимиб, ҳар 2 соатда қабул қилинади. Катталар ва 12 ёшдан ошган болалар учун суткалик доза – 8 таблетка; 4 ёшдан 12 ёшгача болалар учун – 6 таблетка. Одатда, касалликнинг симптомлари бир неча кундан кейин йўқолади, аммо тургун терапевтик самарага эришиш учун даволашни яна 2-3 суткага давом эттириш тавсия қилинади. Агарда препарат 5 суткада қўлланганида пациентнинг ҳолати яхшиланмаса, шифокорнинг маслахати керак.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Фруктозани ўзлаштираолмасликда буюриш мумкин эмас. Препаратнинг ҳар қандай ингридиентларига маълум бўлган юқори сезувчанликда буюриш мумкин эмас. 4 ёшгача бўлган болалар.

Ножўя таъсиrlари

Одатда препарат яхши ўзлаштирилади. Қисқа муддатли таъмни бузилишлари, вақтинчалик тилнинг увишиши пайдо бўлиши мумкин. Кам ҳолларда узок муддат қўлланганида тишларнинг пломбаларини ва протезларни ёки тилни оч жигарранг ёки сариқ рангга аҳамиятсиз бўлиши пайдо бўлиши мумкин, бундай ҳолларда оғиз бўшлигининг гигенасига қатъий риоя қилиш керак. Бўялиш препаратни қўллаш тўхтатилганидан кейин мустақил йўқолади.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсир ҳозирги вақтгача номаълум.

Махсус кўрсатмалар

4 ёшдан кичик болаларда препаратни қўллаш тавсия қилинмайди, чунки препаратни сўриш керак.

Бошқа фармацевтик препаратлар каби, препаратни ҳомиладорлик ва лактация даврида фақат шифокор маслахатидан кейин қўллаш мумкин.

Препарат болалар олаолмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик муддати ўтганидан кейин ишлатилмасин.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборилш ҳоллари кузатилмаган.

Яроқлилик муддати

3 йил.

Сақлаш шароити

Куруқ, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

Энгельхард Арцнаймиттель ГмбХ&Ко.КГ.

Германия, 61138 Нидердорфэльден

Херцбергштрассе 3