

«MA'QULLANGAN»

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining «Dori
vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va
standartlashtirish davlat markazi» DUK

« 23 / 05 / 2018 y. № 12

**ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИКНОМА
ПРОСПАН®**

Препаратнинг савдо номи: Проспан®

Дори шакли: йўталга қарши сироп

Таркиби:

1 мл сироп қуйидагиларни сақлайди:

фаол модда: печак баргларининг қуруқ экстракти (5-7,5:1)-7 мг; экстрагент: этанол 30%;

ёрдамчи моддалар: тозаланган сув, калий сорбати, сувсиз лимон кислотаси, 70% ли сорбитол эритмаси (кристал), ксатан қатрони, олча ароматизатори (2,5 мл эритма 0,963 г сорбитол сақлайди = 0,08 нон бирлиги).

Таъриф: жигаранг, бироз лойқа, хушбўй мева таъмли ва олча ҳидли сироп.

Фармакотерапевтик гуруҳи: ўсимликлардан олинган балғам кўчирувчи воситалар.

Код АТХ: R05CA.

Фармакологик хусусиятлари

Йўталга қарши ўсимлик препарати.

Балғам кўчирувчи, йўталга қарши ва спазмолитик таъсири кўрсатади.

Балғамнинг қовушқоқлигини камайтиради ва унинг ажралиб чиқишини енгиллаштиради.

Қўлланилиши

Юқори нафас йўллари ва ўпкаларнинг яллиғланиш, балғам кўчиш қийн бўлган йўтал билан бирга келган, касаликларини мажмуавий даволашда симптоматик восита сифатида қўлланади.

Қуллаш усули ва дозалари

1 ёшгача бўлган болаларга 2,5 мл дан кунига 2 марта, 1 дан 5 ёшгача бўлган болаларга 2,5 мл дан кунига 3 марта, 6 ёшдан 9 ёшгача бўлган болаларга 5 мл дан кунига 3 марта, катталар ва 10 ёшдан оўган болаларга 5-7,5 мл дан кунига 3 марта илова қилинган ўлчов қалпоқчаси ёрдамида берилади.

Ҳар бир истеъмол қилиш олдиндан флаконни яхшилаб чайқатиш керак.

Эрталаб (тушликда) ва кечқурун истеъмол қилиш керак.

Ҳар бир қабулдан сўнг флаконни зич ёпиш керак!

Қабул қилишнинг давомийлиги

Даволаш курси 1 ҳафтани ташкил қилади.

Терапевтик самарани мустаҳкамлаш учун касалликнинг симптомлари йўқолгандан сўнг даволашни яна 2-3 кун давомида давом эттириш тавсия қилинади.

Беморнинг ҳолати яхшиланмаган ҳолда шифокорга мурожат қилиш зарур.

Ножўя таъсирлари

Печак сақловчи воситасини қабул қилгандан кейин жуда кам ҳолларда хансираш, шиш, терини қизариши ёки қичишиш каби аллергия реакциялар бўлиши мумкин.

Кам ҳолларда юқори сезувчан бўлган пациентларда кўнгил айнаши, қусиши ва диарея каби меъда-ичак бузилишлари кузатилиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг компонентларига юқори сезувчанлик.

Фруктозани ўзлаштираомастик.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Бошқа дорилар билан ўзаро таъсирлар маълум эмас.

Махсус кўрсатмалар

Проспан йўталга қарши сироп, спирт, қанд ва бўёвчиларни сақламайди.

Қандли диабет билан касалланган беморларда 2,5 мл сироп таркибида 0,963 г сорбитол мавжудлиги ҳисобга олиниши керак, бу 0,08 НБ га мос келади. Фруктоза ирсий ўзлаштираолмайдиган беморларга Проспан сиропи қўлланилиши мумкин эмас.

Қўйпечакнинг терапевтик самарали экстрактини ажратиб олиш учун адсорбент сифатида 30 ҳажм% этанол қўлланилган, у кейинчалик қуритиш жараёнида экстрактдан бутунлай йўқотилади.

Ҳомиладорлик ва лактация вақтида қўлланилиши

Ҳомиладор ва эмизикли айолларда дорининг қўлланиш хавсизлиги ҳақида маълумот йўқлиги сабабли, ушбу гуруҳ беморларга ишлатиш тавсия этилмайди.

Автотранспортни бошқариш ва бошқа механизмлар билан ишлашда тезлик реакцияси қобилиятига таъсири.

Таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Препаратнинг кундалик буюрилган дозасидан уч марта юқори миқдорларда қабул қилиш кўнгил айланиши, қусиш ва диареяни чақиритиши мумкин.

Даволаш – симптоматик.

Чиқарилиш шакли

Сироп 100 мл дан флаконларда. 1 флакондан ўлчов қалпоқчаси ва тиббиётда қўлланилишига доир йирикномаси билан бирга картон қутида.

Сақлаш шароити

25°C юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Диққат!

Сақлаш жараёнида печакнинг экстракти борлиги туфайли, эритма бироз хиралашиши ва таъми бироз ўзгариши мумкин, бу препаратнинг терапевтик самарасига таъсир қилмайди.

Яроқлик муддати

3 йил.

Флакон очилгандан кейин яроқлик муддати – 6 ой.

Яроқлик муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

Энгельгард Арцнайmittel ГмбХ & Ко КГ,

Херцбергштрассе 3, 61138 Нидердорфелден, Германия.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларнинг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили.

МЧЖ “France Pharma”

Ўзбекистон, 100041, Тошкент ш., М.Улугбек тумани, Навнихол кўч.86

Тел.: +99871 2309193;

E-mail: infopharmaff@gmail.com