



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**ДИСТРЕПТАЗА  
(DISTREPTAZA®)**

**Торговое наименование**  
ДИСТРЕПТАЗА

**Международное непатентованное наименование:** streptodornase + streptokinase

**Состав**

1 суппозиторий (2 г) содержит:

*действующие вещества:* стрептокиназа 15000 МЕ, стрептодорназа 1250 МЕ;

*вспомогательные вещества:* парафин жидкий, жир твердый.

**Лекарственная форма**

Суппозитории ректальные

**Описание**

Форма конусов или «торпед» с заостренным концом; без механических повреждений с окраской от белой до кремовой

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие гематологические препараты. Прочие гематологические препараты. Ферментные препараты. Стрептокиназа, комбинации.

Код АТХ В06АА55.

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Лекарственный препарат содержит два действующих вещества: стрептокиназу и стрептодорназу.

Стрептокиназа является активатором проэнзима плазминогена, содержащегося в крови человека, который под влиянием стрептокиназы превращается в плазмин, обладающий свойством растворять сгустки крови.

Стрептодорназа является ферментом, проявляющим способность к растворению липких масс нуклеопротеинов, мертвых клеток или гноя, при этом не оказывая воздействия на живые клетки и их физиологические функции.

Препарат применяют как самостоятельный вид лечения, так и в качестве вспомогательного препарата, улучшающего доступ антибактериальных или химиотерапевтических средств к очагу воспаления.

Препарат помогает уменьшить выраженность субъективной симптоматики и значительно сократить длительность терапии.

*Фармакокинетика*

Данные отсутствуют.

**Клинические данные**

**Показания к применению**

Комплексная терапия воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ): инфекций яичников, фаллопиевых труб, матки.

Спаечная болезнь после операций на органах малого таза.

Острый и хронический геморрой.

Комплексная терапия абсцесса области заднего прохода и прямой кишки, а также свищей с обширным воспалительным инфильтратом.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ.

Наличие ран, покрытых свежим струпом, или хирургических швов в области введения: лекарственный препарат не должен соприкасаться с раной, покрытой свежим струпом или свеженаложёнными швами, т.к. это может привести к ослаблению швов и последующему кровотечению в области раны.

Предшествующие кровотечения (первые 10 дней после прекращения), из-за возрастания риска возникновения повторного кровотечения.

Лечение препаратами, содержащими соли кальция.

Острое течение заболеваний соединительной ткани без признаков нагноения.

Нарушения свертываемости крови.

Лечение антикоагулянтами (препаратами, снижающими активность свертывающей системы крови), из-за возрастания риска возникновения кровотечения.

## **Режим дозирования и способ применения**

### Режим дозирования

*Взрослые (старше 18 лет)*

Дозировка зависит от типа и степени тяжести воспаления.

Применять в соответствии с указаниями врача.

При тяжелых состояниях:

по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение первых 3-х дней;

по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение последующих 3-х дней;

по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение последующих 3-х дней.

При более легких состояниях:

по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение первых 3-х дней;

по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение последующих 4-х дней;

или

по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 2-х дней.

Средний курс лечения – 8-18 суппозиторийев.

Продолжительность курса лечения составляет в среднем 7-10 дней.

### *Дети*

Безопасность и эффективность у детей на данный момент не установлены.

### *Особые группы*

#### *Лица пожилого возраста*

Информация о необходимости коррекции дозы лицам пожилого возраста (старше 65 лет) отсутствует.

#### *Пациенты с печеночной недостаточностью*

Препарат не метаболизируется в печени, в связи с этим необходимость в коррекции дозы пациентам с печеночной недостаточностью отсутствует.

#### *Пациенты с почечной недостаточностью*

Информация о необходимости коррекции дозы пациентам с почечной недостаточностью отсутствует.

### Способ применения

После извлечения из контурной ячейковой упаковки, суппозиторий следует ввести глубоко в прямую кишку.

### **Нежелательные реакции**

Редко ( $\geq 1/10\ 000$ , но  $< 1/1\ 000$ ):

Общие нарушения и реакции в месте введения: аллергические реакции, повышение температуры тела, а также склонность к кровотечениям, местная болезненность и отек.

### **Особые указания и меры предосторожности при применении**

Может вызывать местное раздражение.

### **Фертильность, беременность и лактация**

Не рекомендуется применять в период беременности.

Не следует применять во время кормления грудью.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами.

### **Передозировка**

Данные отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия**

Противопоказано одновременное применение с антикоагулянтами (препаратами, снижающими активность свертывающей системы крови), из-за возрастания риска возникновения кровотечения.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в холодильнике (2-8 °С). Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

6 суппозитория в упаковке контурной ячейковой (ПВХ/ПЭ блистер). По 1 блистеру с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

### **Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

### **Производитель**

„БИОМЕД-ЛЮБЛИН“ Вытвурня Суровиц и Щепёнэк Спупка Акцыйна

ул. Университетская 10,

20-029 Люблин,

Польша

### **Наименование и местонахождение (почтовый адрес) организации, принимающей на территории Республики Узбекистан претензии (предложения) по качеству лекарственных средств**

ООО «France Pharma»

Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86

тел.: +998712309193

e-mail: infopharmaff@gmail.com.