«УТВЕРЖДЕНО»
Фармакологический комитет
Государственного учреждения
«Центр безопасности фармацевтической
продукции» Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан
«27» 03 2025 г. № 8

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ДИСТРЕПТАЗА

Торговое название препарата: ДИСТРЕПТАЗА
Действующее вещество (МНН): streptokinase + streptodornase
Состав
1 суппозиторий (2 г) содержит:
действующие вещества: стрептокиназа 15000 МЕ, стрептодорназа 1250 МЕ;
вспомогательные вещества: парафин жидкий, жир твердый.
Лекарственная форма: Суппозитории ректальные
Описание: Форма конусов или «торпед» с заостренным концом; без механических повреждений с окраской от белой до кремовой
Фармакотерапевтическая группа. Прочие гематологические препараты. Ферментные препараты. Стрептокиназа, комбинации.
Код АТХ: B06AA55.

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Лекарственный препарат содержит два действующих вещества: строптокиназу и стрептодорназу.
Стрептокиназа является активатором проэнзима плазминогена, содержащегося в крови человека, который под влиянием стрептокиназы превращается в плазмин, обладающий свойством растворять сгустки крови.
Стрептодорназа является ферментом, проявляющим способность к растворению липких масс нуклеопротеинов, мертвых клеток или гноя, при этом не оказывая воздействия на живые клетки и их физиологические функции.
Препарат применяют как самостоятельный вид лечения, так и в качестве вспомогательного препарата, улучшающего доступ антибактериальных или химиотерапевтических средств к очагу воспаления.
Препарат помогает уменьшить выраженность субъективной симптоматики и значительно сократить длительность терапии.
Фармакокинетика
Данные отсутствуют.

Показания к применению
Комплексная терапия воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ): инфекций яичников, фаллопиевых труб, матки.
Спаечная болезнь после операций на органах малого таза.
Острый и хронический геморрой.
Комплексная терапия абсцесса области заднего прохода и прямой кишки, а также свищей с обширным воспалительным инфильтратом.

Противопоказания
Гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ.
Наличие ран, покрытых свежим струпом, или хирургических швов в области введения: лекарственный препарат не должен соприкасаться с раной, покрытой свежим струпом или свеженаложенными швами, т.к. это может привести к ослаблению швов и последующему кровотечению в области раны.

Предшествующие кровотечения (первые 10 дней после прекращения), из-за возрастания риска возникновения повторного кровотечения.
Лечение препаратами, содержащими соли кальция.
Острое течение заболеваний соединительной ткани без признаков нагноения.
Нарушения свертываемости крови.
Лечение антикоагулянтами (препаратами, снижающими активность свертывающей системы крови), из-за возрастания риска возникновения кровотечения.

Способ применения и дозы
Режим дозирования
Взрослые (старше 18 лет)
Дозировка зависит от типа и степени тяжести воспаления.
Применять в соответствии с указаниями врача.

При тяжелых состояниях:
по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение первых 3-х дней;
по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение последующих 3-х дней;
по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение последующих 3-х дней.

При более легких состояних:
по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение первых 3-х дней;
по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение последующих 4-х дней;
или
по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 2-х дней.

Средний курс лечения – 8-18 суппозиториев.
Продолжительность курса лечения составляет в среднем 7-10 дней.

Дети
Безопасность и эффективность у детей на данный момент не установлены.

Особые группы
Лица пожилого возраста
Информация о необходимости коррекции дозы лицам пожилого возраста (старше 65 лет) отсутствует.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Препарат не метаболизируется в печени, в связи с этим необходимость в коррекции дозы пациентам с печеночной недостаточностью отсутствует.
Пациенты с почечной недостаточностью
Информация о необходимости коррекции дозы пациентам с почечной недостаточностью отсутствует.

Способ применения
После извлечения из контурной ячейковой упаковки, суппозиторий следует ввести глубоко в прямую кишку.

Побочные действия
Редко (≥1/10 000, но <1/1 000):
Общие нарушения и реакции в месте введения: аллергические реакций, повышение температуры тела, а также склонность к кровотечениям, местная болезненность и отек.

Особые указания
Может вызывать местное раздражение.

Применение при беременности и в период лактации
Не рекомендуется применять в период беременности.
Не следует применять во время кормления грудью.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами
Не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами.

Передозировка
Данные отсутствуют.

Лекарственные взаимодействия
Противопоказано одновременное применение с антикоагулянтами (препаратами, снижающими активность свертывающей системы крови), из-за возрастания риска возникновения кровотечения.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения
Хранить в холодильнике (2-8 °С). Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска
6 суппозиториев в упаковке контурной ячейковой (ПВХ/ПЭ блистер). По 1 блистеру с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель
Синтаверс С.А.
ул. Университетская 10,
20-029 Люблин,
Польша

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ООО «France Pharma»
Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86
тел.: +998712309193
e-mail: infopharmaff@gmail.com