



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ДЕНТОКИНД А
(DENTOKIND® А)**

Торговое название
ДЕНТОКИНД А (DENTOKIND® А)

Лекарственная форма
Таблетки

Международное непатентованное название: нет

Состав

1 таблетка (100 мг) содержит:

действующие вещества: Belladonna trit. D6 15 мг, Chamomilla trit. D6 15 мг, Ferrum phosphoricum trit. D6 15 мг, Hepar sulfuris trit. D12 15 мг; Pulsatilla trit. D6 15 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, магния стеарат, тальк.

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия заметно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных веществ. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активируют его способность к самовосстановлению. Реакция организма на гомеопатическое лекарство очень индивидуальна. По этим причинам дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Симптомы, возникающие при прорезывании зубов, такие как раздражительность, беспокойство, боль в ушах, болезненность десен, легкая лихорадка и жидкий стул у младенцев и детей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из действующих веществ или к любому из компонентов препарата.

Особые указания и меры предостережения

Препарат не рекомендуется принимать вместе с едой. Лучше всего принимать таблетки за полчаса до или через пол часа после еды.

Если Ваш врач говорил, что у Вашего ребенка непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать препарат.

Лекарственное средство содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это лекарственное средство.

Проконсультируйтесь с врачом:

- если ребенок плохо реагирует на препарат;
- если возникают дополнительные жалобы.

Применение во время беременности и в период кормления грудью

Препарат предназначен для детей.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Препарат предназначен для детей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Применение этого гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок принимает, недавно принимал или может принимать любые другие лекарственные средства.

Режим дозирования и способ применения

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом

Режим дозирования.

Дети до 1 года: При острых симптомах назначают по 1 таблетке каждый час, максимум до 6 таблеток в день.

При ослаблении симптоматики назначают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте от 1 до 6 лет:

При острых симптомах назначают по 2 таблетки каждый час, максимум до 12 таблеток в день.

При ослаблении симптоматики назначают по 2 таблетки 3 раза в день.

Способ применения

Таблетки следует медленно рассасывать во рту. Для маленьких детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Следует принимать таблетки за полчаса до или через полчаса после еды.

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы возместить пропущенный прием препарата.

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

В случае прекращения приема препарата никаких вредных последствий не ожидается.

Побочные реакции

Как и все лекарственные средства, препарат может вызывать побочные реакции, но развиваются они не у каждого.

Побочные эффекты не известны.

Если вы считаете, что у вашего ребенка возникли какие-либо побочные эффекты, поговорите с врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты, не указанные в этой инструкции.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических препаратов (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Не установлена.

Упаковка

150 таблеток во флаконе. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «France Pharma»

Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86

Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com