



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ИММУНОКИНД А (IMMUNOKIND® А)

### Торговое название

ИММУНОКИНД А (IMMUNOKIND® А)

### Лекарственная форма

Таблетки

**Международное непатентованное название:** нет

### Состав

1 таблетка (100 мг) содержит:

*действующие вещества:* Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20 мг, Calcium fluoratum trit. D6 20 мг, Calcium phosphoricum trit. D6 20 мг, Sulfur jodatum trit. D12 20 мг;

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, тальк.

### Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.

### Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

### Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия заметно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных веществ. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активируют его способность к самовосстановлению. Реакция организма на гомеопатическое лекарство очень индивидуальна. По этим причинам дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

### Показания к применению

Для повышения резистентности к рецидивирующим инфекциям верхних дыхательных путей у детей грудного и младшего возраста.

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из действующих веществ или к любому из компонентов препарата.

### Особые указания и меры предостережения

Препарат не следует принимать вместе с едой. Рекомендуется принимать таблетки за полчаса до или через пол часа после еды.

Если Ваш врач говорил, что у Вашего ребенка непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать препарат.

Лекарственное средство содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это лекарственное средство.

Проконсультируйтесь с врачом:

- если ребенок плохо реагирует на препарат;
- если возникают дополнительные жалобы.

Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок страдает заболеванием щитовидной железы, прежде чем начинать лечение препаратом.

Не рекомендуется применять препарат для длительного лечения без консультации с врачом.

### **Применение во время беременности и в период кормления грудью**

Препарат предназначен для детей.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами**

Препарат предназначен для детей.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Применение этого гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок принимает, недавно принимал или может принимать любые другие лекарственные средства.

### **Режим дозирования и способ применения**

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом

Режим дозирования:

Дети в возрасте до 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в день.

Способ применения

Таблетки следует медленно рассасывать во рту. При необходимости, таблетки можно растворить в небольшом количестве воды.

Следует принимать таблетки за полчаса до или через полчаса после еды.

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы возместить пропущенный прием препарата.

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

В случае прекращения приема препарата никаких вредных последствий не ожидается.

### **Побочные реакции**

Как и все лекарственные средства, препарат может вызывать побочные реакции, но развиваются они не у каждого.

Побочные эффекты не известны.

Если вы считаете, что у вашего ребенка возникли какие-либо побочные эффекты, поговорите с врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты, не указанные в этой инструкции.

*Примечание:* существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических препаратов (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### **Передозировка**

Не установлена.

**Упаковка**

150 таблеток во флаконе. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия

**Владелец РУ**

Альпен Фарма ГмбХ  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан**

ООО «France Pharma»

Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86

Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com