



**ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА**  
**ИНФЛЮЦИД А**  
**(INFLUCID® А)**

**Савдо номи:** ИНФЛЮЦИД А (INFLUCID® А)

**Дори шакли:** таблеткалар

**Халқаро патентланмаган номи:** йўк

**Таркиби**

1 таблетка (250 мг) қуйидагиларни сақлайди:

*таъсир этувчи моддалар:* 25 мг Aconitum trit. D3, 25 мг, Gelsemium trit. D3, 25 мг  
Ipecacuanha trit. D3, 25 мг Phosphorus trit. D5, 25 мг Bryonia trit. D2, 25 мг Eupatorium  
perfoliatum trit. D1;

*ёрдамчи моддалар:* лактоза моногидрати, буғдой крахмали, магний стеарати.

**Таърифи**

Оқ ёки деярли оқ, ясси цилиндрик шаклли, фаскали таблеткалар, бироз доғларни бўлишига йўл қўйилади.

**Фармакотерапевтик гуруҳи**

Гомеопатик дори воситаси.

**Фармакологик хусусиятлари**

Гомеопатик даволаш касалликни тушуниш маъносида ва дори воситаларини қўлланишида анъанавий тиббиётдан аҳамиятли фарқ қилади. Гомеопатик воситалар организмнинг химоя механизмларини рағбарлантиради ва шу тарзда ўзини-ўзи тиклаш қобилиятини фаоллаштиради. Гомеопатик воситаларга организмнинг реакцияси жуда шахсий. Шу сабабларга кўра доза-специфик фармакологик самаралар, фармакодинамик ёки фармакокинетик маълумотларни аниқлашнинг имконияти йўк.

**Қўлланилиши**

Иситмали грипга ўхшаш инфекциялар ва бошқа ўткир вирусли инфекцияларни даволаш ва олдини олиш. Гриппни бир маромда тутиб турувчи даволашда қўлланади.

**Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар**

Пронзенбаргли посконник (оддий посконник) ёки бошқа астра/мураккаб гулли оила вакиллари, бошқа таъсир этувчи моддаларнинг бирортасига ёки препаратнинг ҳар қандай компонентларига юқори сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

1 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

**Махсус кўрсатмалар ва эҳтиёткорлик чоралари**

Агар Сизнинг шифокорингиз Сизда айрим қандларни ўзлаштираолмаслик ҳақида огоҳлантирган бўлса, препаратни қабул қилишни бошлашдан аввал шифокор билан маслаҳатлашинг.

Дори воситаси лактоза ва буғдой крахмалини сақлайди. Галактозани ўзлаштираолмасликнинг кам наслий муаммолари, Лаппа лактаза танқислиги ёки глюкоза-галактозани кам сўрилиши каби бўлган пациентлар ушбу дори воситасини қабул қилишлари мумкин эмас.

Буғдой крахмали глютен сақлаши мумкин, бироқ жуда кам миқдорларда ва шунинг учун целиакияси бўлган инсонлар учун хавфсиз ҳисобланиши мумкин. Буғдойга аллергияси бўлган пациентлар (целиакиядан фарқ қилади) ушбу дори препаратини қабул қилишлари мумкин эмас.

Агар қуйидаги симптомлар пайдо бўлса:

- агар ҳолат яхшиланмаса ёки ёмонлашса,
- агар қўшимча шикоятлар пайдо бўлса,
- агар ҳарорат сақланиб турса ёки 39°C дан ошса шифокорнинг маслаҳати талаб этилади.

#### **Ҳомиладорлик вақтида ва эмизиш даврида қўлланилиши**

Препаратни ҳомиладорлик ва эмизиш вақтида фақат фойда ва хавф нисбати баҳосини ҳисобга олиб қўллаш мумкин.

Пациентларга ушбу дори воситасини қўллашдан аввал шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

#### **Транспорт воситалари ёки бошқа механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири**

Таъсир этмайди.

#### **Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири**

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири кузатилмаган. Ушбу гомеопатик дори воситасини қўллаш бошқа дори воситаларини қабул қилишни чекламайди.

Агар пациент бирон бир бошқа дори воситаларини яқинда қабул қилган, қабул қилаётган ёки қабул қилишни режалаштирган бўлса шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

*Эслатма:* гомеопатик дори препаратларининг таъсирига чекиш ва алкогольни истеъмол қилиш каби ҳаётнинг ёмон одатлари салбий таъсир этиши мумкин.

#### **Дозалаш тартиби ва қўллаш усули**

Доимо ушбу тиббиётда қўлланишига доир йўриқномага ёки ўзингизни шифокорингиз ёки фармацевтнинг кўрсатмаларига риоя қилинг. Агар сиз препаратни тўғри қабул қилаётганингизга ишонч ҳосил қилмасангиз ўзингизни шифокорингиз ёки фармацевт билан маслаҳатлашинг.

##### Дозалаш тартиби:

Катталар: ўткир ҳолатларда 1 таблеткадан бир соат танаффуз билан қабул қилинади, кунига максимум 12 таблеткагача соғайиш бошлангунгача. Кейинги даволаниш учун 1-2 таблеткадан кунига 3 марта.

Инфекцияни олдини олиш учун, 1-2 таблеткадан кунига 3 марта.

##### Болалар

1 ёшдан 11 ёшгача бўлган болалар: ўткир ҳолатларда 1 таблеткадан икки соат танаффуз билан қабул қилинади, кунига максимум 8 таблеткагача соғайиш бошлангунгача. Кейинги даволаниш учун 1 таблеткадан кунига 3 марта.

12 ёш ва ундан катта болалар: ўткир ҳолатларда 1 таблеткадан бир соат танаффуз билан қабул қилинади, кунига максимум 12 таблеткагача соғайиш бошлангунгача. Кейинги даволаниш учун 1-2 таблеткадан кунига 3 марта.

Инфекцияни олдини олиш учун 1 дан 11 ёшгача бўлган болалар 1 таблеткадан кунига 3 марта, 12 ёш ва ундан катта болалар эса - 1-2 таблеткадан кунига 3 марта қабул қилинади.

##### Қўллаш усули

Таблеткаларни оғизда аста-секин сўриш лозим. Кичик болалар учун таблеткаларни кўп бўлмаган миқдордаги сув билан эритиш мумкин.

Овқатни истеъмол қилишдан ярим соат олдин ёки ярим соат кейин танаффузларга амал қилиш лозим.

**Ножўя реакциялари**

Жуда кам ҳолларда (<1/10000) ёки тез-тезлиги номаълум (мавжуд маълумотлар асосида баҳолашнинг иложи йўқ):

Ўта юқори сезувчанлик реакциялари, масалан тери тошмалари ва меъда-ичак бузилишлари кузатилиши мумкин.

Бундай ҳолларда препаратни қабул қилишни тўхтатиш ва шифокорга мурожаат қилиш керак.

*Эслатма:* гомеопатик препаратларни қабул қилиш вақтида мавжуд бўлган шикоятлар вақтинчалик ёмонлашиши мумкин (бошланғич гомеопатик зўриқиш). Бундай ҳолларда пациентларга препаратни қабул қилишни тўхтатиш ва шифокор билан маслаҳатлашиш тавсия этилади.

**Дозани ошириб юборилиши**

Аниқланмаган.

**Ўрами**

20 таблеткалар блистерда, 2 блистер тиббиётда қўлланишига доир йўриқнома билан бирга ўрамда.

**Сақлаш шароити**

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда, болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

**Яроқлилиқ муддати**

5 йил.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилиқ муддати тугаганидан сўнг қўлланмасин.

**Дорихоналардан бериш тартиби**

Рецептсиз.

**Ишлаб чиқарувчи**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия

**Рўйхатдан ўтказилганлик гувоҳномасининг эгаси**

Альпен Фарма ГмбХ  
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,  
Германия

**Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили**

“France Pharma” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси, 100041, Тошкент ш., М.Улуғбек тумани, Навнихол кўч. 86

Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com