



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
КИНДИНОРМ А
(KINDINORM® А)

Торговое название: КИНДИНОРМ А (KINDINORM® А)

Лекарственная форма: Гранулы

Международное непатентованное название: нет

Состав

В 10 г гранул (размер 5) содержится:

действующие вещества: Chamomilla dil. D12 25 мг, Valeriana dil. D6 25 мг, Kalium phosphoricum dil. D6 25 мг, Staphisagria dil. D12 25 мг;

вспомогательные вещества: сахароза.

Описание

Сферические гранулы белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия заметно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных веществ. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активируют его способность к самовосстановлению. Реакция организма на гомеопатическое лекарство очень индивидуальна. По этим причинам дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Поведенческие расстройства у детей и подростков с дефицитом внимания и концентрации, нервной возбудимостью, двигательной гиперактивностью, трудностями в обучении, нарушениями сна или состояниями общей слабости.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам.

Особые указания и меры предостережения

Препарат не рекомендуется принимать вместе с едой.

Если Ваш врач говорил, что у Вас/Вашего ребенка непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать препарат.

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозо-изомальтазной недостаточностью не следует принимать это лекарственное средство.

Киндинорм А не следует применять детям в возрасте до 1 года из-за отсутствия данных о безопасности и эффективности препарата.

Проконсультируйтесь с врачом:

- если улучшение не наступает в течение 8 недель,

- если возникают дополнительные жалобы.

Применение во время беременности и в период кормления грудью

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед применением этого лекарственного средства.

Как и все фармацевтические препараты, Киндинорм А следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работу с механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействий с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Применение этого гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Рекомендуется проконсультироваться с врачом, если ребенок принимает, недавно принимал или может принимать любые другие лекарственные средства.

Примечание: на действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек такие как курение и употребление алкоголя.

Режим дозирования и способ применения

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом

Режим дозирования:

Дети в возрасте от 1 до 5 лет: 2 гранулы от 1 до 3 раз в день

Дети в возрасте от 6 до 11 лет: 3 гранулы от 1 до 3 раз в день

Подростки в возрасте 12 лет и старше: 5 гранул от 1 до 3 раз в день

Частота приемов должна быть уменьшена по мере уменьшения жалоб.

Способ применения

Гранулы следует медленно рассасывать во рту. Для маленьких детей гранулы можно растворить в небольшом количестве воды.

Гранулы рекомендуется принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы возместить пропущенный прием препарата.

В случае передозировки никаких вредных последствий не ожидается.

В случае прекращения приема препарата никаких вредных последствий не ожидается.

Побочные реакции

Как и все лекарственные средства, препарат может вызывать побочные реакции, но развиваются они не у каждого.

Побочные эффекты не известны.

Если вы считаете, что у Вашего ребенка возникли какие-либо побочные эффекты, поговорите с врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты, не указанные в этой инструкции.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических препаратов (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Не установлена.

Упаковка

20 г гранул во флаконе. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ.
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «France Pharma»

Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навихол 86

Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com