



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ТОНЗИЛОТРЕН А

Торговое название

ТОНЗИЛОТРЕН А (TONSILOTREN® А)

Лекарственная форма

Таблетки

Международное непатентованное название: нет

Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

действующие вещества: Atropinum sulfuricum trit. D5 12,5 мг, Hepar sulfuris trit. D3 10,0 мг, Kalium bichromicum trit. D4 50,0 мг, Silicea trit. D2 5,0 мг, Mercurius bijodatus trit. D8 25,0 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат.

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия явно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных субстанций. Гомеопатические средства стимулируют защитные силы самого организма и активируют таким образом его потенциал самоизлечения. Реакция организма на гомеопатическое средство очень индивидуальна. По этой причине дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Острый тонзиллит, хронический или рецидивирующий острый тонзиллит и увеличение миндалин. Для ускорения заживления после хирургического удаления миндалин.

Противопоказания

Препарат не следует применять при известной гиперчувствительности к хрому, ртути, любым другим активным веществам или любому из вспомогательных веществ.

Противопоказан детям до 2 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Если Ваш врач говорил Вам, что у Вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать Тонзилотрен А.

Препарат содержит лактозу и сахарозу. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы не должны принимать этот лекарственный препарат. Также пациентам с редкими

наследственными проблемами непереносимости фруктозы или сахарозо-изомальтазной недостаточности не следует принимать препарат.

Проконсультируйтесь с Вашим врачом в случае:

– если симптомы острого состояния не улучшаются или ухудшаются после первых 2 дней лечения;

– если возникают дополнительные жалобы, например, температура тела выше 39°C.

Пациентам, страдающим заболеваниями щитовидной железы, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Тонзилотрен А.

Применение во время беременности и в период кормления грудью

Принимать Тонзилотрен А во время беременности или в период кормления грудью можно только после предварительной консультации с врачом.

Как и все лекарственные препараты, Тонзилотрен А следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом, если они принимают, недавно принимали или могут принимать любые другие лекарственные средства.

Примечание: на действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек такие как курение и употребление алкоголя.

Режим дозирования и способ применения

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Режим дозирования

Взрослые: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* или при *хронических состояниях*, принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Педиатрическая группа

Дети с 2 до 6 лет: при *острых состояниях* и для *последующего лечения* или при *хронических состояниях*, принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети с 6 до 12 лет: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждые 2 часа, но не более 6 таблеток в день, до улучшения симптомов. При *последующем лечении* или при *хронических состояниях*, принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети с 12 лет и старше: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* или при *хронических состояниях*, принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

При *увеличении миндалин* взрослые и дети принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Рекомендуется продолжать лечение в течение 6-8 недель.

При хронических и рецидивирующих острых состояниях следует применять несколько циклов лечения в год продолжительностью 6-8 недель каждый.

Способ применения

Таблетки должны медленно растворяться во рту.

Для маленьких детей таблетки можно измельчить, а затем растворить в небольшом количестве воды.

Следует соблюдать интервал не менее получаса до или через полчаса после приема еды.

Побочные реакции

В очень редких случаях (<1/10000) или неизвестных (частота не может быть оценена по имеющимся данным); могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, например, сыпь на коже. В таких случаях следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При усилении слюноотделения рекомендуется снизить дозу или прекратить прием препарата.
Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Зарегистрированных случаев передозировки нет.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере. По 2 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «France Pharma»

Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86

Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com