



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СОЛИДАГОРЕН

Торговое название препарата: Солидагорен

Лекарственная форма: капли оральные

Состав:

активное вещество: 10 мл (= 9,5 г) капель содержат 7,9 мл жидкого экстракта (1:1,5 - 2,1) смеси травы золотарника (*Solidaginis herba*), травы лапчатки гусиной (*Anserinae herba*), травы хвоща (*Equiseti Herba*) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50% (об/об);
вспомогательные вещества: вода очищенная, этанол 96%.

Описание: прозрачная жидкость коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые в урологии.

Код ATХ: G04BP50

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Традиционное растительное лекарственное средство.

Отдельные фармакодинамические исследования на препарат не проводились.

Фармакокинетика

Не изучена

Показания к применению

Основная (базисная) терапия, а также как компонент комплексной терапии при острых и хронических инфекциях мочевого пузыря (цистит) и почек (пиелонефрит).

Хронические неинфекционные заболевания почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит).

Профилактика образования мочевых камней, в том числе и после их удаления.

Дети.

Препарат не предназначен для применения у детей в возрасте до 12 лет.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет:

20 - 30 капель Солидагорена 3 раза в день. 30 капель соответствует 1,4 мл.

Солидагорен следует принимать с достаточным количеством жидкости.

Длительность применения определяется врачом индивидуально.

Побочные действия

Очень редко: реакции гиперчувствительности и аллергические реакции.

Частота неизвестна: легкие расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, сыпь) прием препарата следует прекратить. В случае появления побочных эффектов, не указанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому компоненту препарата. Не следует применять препарат Солидагорен в случае аллергии на растения семейства Астровые (*Asteraceae*), поскольку растения указанного семейства используются при производстве растительного экстракта, который входит в состав препарата.

Лекарственные взаимодействия

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

В связи с наличием алкоголя в препарате, он может влиять на действие других препаратов.

Особые указания

Не следует применять препарат для диуретической терапии отеков, вызванных сердечной недостаточностью или почечной недостаточностью. Это особенно важно учитывать при применении у людей пожилого возраста.

При наличии крови в моче, высокой температуры тела или при сохранении симптоматики более 5 дней, рекомендовано обратиться к врачу.

Препарат содержит 45% об/об спирта. При соблюдении рекомендуемой дозы в организм попадают 0,6 г алкоголя с каждым приемом 30 капель.

Применение при беременности и в период лактации

Из-за содержания в составе Солидагорена экстракта хвоща (*Equisetum arvense*) применение в период беременности данного лекарственного средства противопоказано.

В период кормления грудью Солидагорен можно применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риска для ребенка

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не влияет при соблюдении рекомендованных доз.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось. В случае передозировки - лечение симптоматическое.

Форма выпуска

По 20 мл, 50 мл или 100 мл капель во флаконе с капельницей и с пластмассовой завинчивающейся крышкой. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в защищённом от света и недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Срок хранения после вскрытия флакона - 3 месяца.

Солидагорен после даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ,
Штайненфельд 3, 77736, Целль ам Хармерсбах, Германия

Эксклюзивный представитель

Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО “France Pharma”

Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86

Тел.: + 99871 230 91 93

E-mail: infopharmaff@gmail.com