

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИКНОМА СОЛИДАГОРЕН

Препаратнинг савдо номи: Солидагорен

Дори шакли: ичга қабул қилиш учун томчилар.

Таркиби:

фаол модда: 10 мл (= 9,5 г) томчи 7,9 мл (1:1,5 - 2,1) золотарник ўти аралашмаси (Solidaginis herba) суюқ экстракт, ғоз панжаси ўти (Anserinae herba), дала қирқбўғими ўти (Equiseti Herba) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (ҳажм нистат) сақлайди;

ёрдамчи моддалар: тозаланган сув, 96% этанол.

Таърифи: жигар рангли тиниқ суюқлик

Фармакотерапевтик гуруҳи: урологияда қўлланадиган воситалар

АТХ коди: G04BP50

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Ананавий ўсимликлардан олинган дори воситаси.

Препарат бўйича алоҳида фармакодинамик текширувлар ўтказилмаган.

Фармакокинетикаси

Ўрганилмаган.

Қўлланилиши

Қовуқ (цистит) ва буйракларнинг (пиелонефрит) ўткир ва сурункали инфекцияларида асосий (базисли) даволаш, шунингдек мажмуавий даволаш компоненти сифатида қўлланади..

Буйракнинг сурункали инфекцион бўлмаган касалликлари (гломерулонефрит, интерстициал нефрит).

Сийдик тош касалликларини ҳосил бўлиши, шу жумладан уларни олиб ташлагандан кейинги профилактикада қўлланади.

Болалар.

Препаратни 12 ёшгача бўлган болаларда қўллаш чун мўлжалланган.

Қўллаш усули ва дозалари

Катталар ва 12 ёшдан катта болаларга:

20-30 томчи Солидагоренни кунига 3 марта. 30 томчи 1,4 мл га мувофиқ келади.

Солидагоренни етарлича миқдордаги сув билан қабул қилиш керак.

Қўллаш давомийлиги шифокор томонидан шахсий равишда белгиланади.

Ножўя таъсири

Жуда кам: ўта юқори сезувчанлик реакциялари ва аллергия реакциялар.

Тез-тезлиги номасълум: меъда-ичак йўллари томонидан енгил бузилишлар.

Аллергия реакцияларнинг биринчи белгилари пайдо бўлган ҳолларда (масалан, тошма) препаратни қабул қилишни тўхтатиш керак. Йўрикномада кўрсатилмаган ножўя самаралар пайдо бўлган ҳолларда шифокорга мурожаат қилиш керак.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратнинг фаол моддасига ёки ҳар қандай компонентларига юқори сезувчанлик. Солидагорен препаратини Астров (Asteraceae), оиласи ўсимликларига аллергия ҳолларида

қўллаш мумкин эмас, чунки ушбу оилага мансуб ўсимликлар препаратнинг таркибига кирувчи ўсимлик экстрактини ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири ҳолатлари номаълум.

Препаратда алкоголь мавжудлиги сабабли, у бошқа препаратларнинг таъсирига таъсир қилади.

Махсус кўрсатмалар

Юрак етишмовчилиги ёки буйрак етишмовчилиги чақирган шишларни диуретик даволаш учун препаратни қўллаш мумкин эмас. Буни айниқса кексаларда қўллаганда эътиборга олиш керак.

Сийдикда қон мавжудлиги, юқори тана ҳарорати ёки симптомлар 5 кундан ортиқ сақланган ҳолларда шифокорга мурожаат қилиш керак.

Препарат 45% хажми нисбатда спирт сақлайди. Тавсия этилган дозага риоя қилинганда ҳар 30 томчи билан организмга 0,6 г алкоголь киради.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланиши

Солидагореннинг қирқбўғим ўти (*Equisetum arvens*) таркибида мавжудлиги туфайли ҳомиладорлик пайтида препаратни қўллаш мумкин эмас.

Эмизиш даврида она учун фойда/хавф даражаси шифокор томонидан баҳолангандан кейинг қўллаш мумкин.

Автомобилни ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Тавсия этилган дозаларга риоя қилганда таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Доза ошириб юборилиш ҳолатлари ҳақида хабар берилмаган. Доза ошириб юборилиш ҳолатларида - симптоматик даволаш ўтказилади.

Чиқарилиш шакли

Ичга қабул қилиш учун томчилар.

20 мл, 50 мл ёки 100 мл дан томчилагичли ва пластмасса бураладиган қопқоқли флаконларда. 1 флакон тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан картон қутига жойланган.

Сақлаш шароити

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда, оригинал ўрамда сақлансин.

Ёруғликдан ҳимояланган жойда ва болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

3 йил.

Флакон очилгандан кейин яроқлилик муддати – 3 ой.

Солидагорен яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Эксклюзив вакили

Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария

Рўйхатга олиш гувоҳномаси егаси

Альпен Фарма ГмБХ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Ишлаб чиқарувчи

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Цельль ам Хармерсбах, Германия

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларнинг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)ни қабул қилувчи ташкилотнинг номи ва манзили.

МЧЖ “France Pharma”

Ўзбекистон, 100041, Тошкент ш., М.Улугбек тумани, Навнихол кўч.86

Тел: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com