



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СИНОСАН А (SINOSAN® А)

Торговое название: СИНОСАН А (SINOSAN® А)

Лекарственная форма: таблетки

Международное непатентованное название: нет

Состав

1 таблетка (250 мг) содержит:

действующие вещества: Cinnabaris trit. D3 - 25 мг, Echinacea trit. D1 - 25 мг, Hydrastis trit. D3 - 25 мг, Kalium bichromicum trit. D3 - 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия заметно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных веществ. Гомеопатические средства стимулируют защитные механизмы организма и тем самым активируют его способность к самовосстановлению. Реакция организма на гомеопатическое лекарство очень индивидуальна. По этим причинам дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Острый и хронический риносинусит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из активных веществ или к одному из компонентов препарата, или членам семейства сложноцветных.

Противопоказан детям до 2 лет.

Особые указания и меры предостережения

Если Ваш врач говорил Вам, что у Вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с ним до того, как начать принимать Синосан А.

Препарат не рекомендуется применять при прогрессирующих системных заболеваниях (таких как туберкулез, саркоидоз), системных заболеваниях крови (например, лейкемии и лейкоз), аутоиммунных заболеваниях (например, при воспалительных заболеваниях коллагеновой ткани (коллагенозы), рассеянном склерозе), иммунодефиците (СПИД, ВИЧ-инфекции), при угнетенном состоянии (например, после трансплантации органа или костного мозга, химиотерапия).

После приема лекарств, содержащих эхинацею, наблюдались кожная сыпь, зуд и в редких случаях отек лица, одышка, головокружение и падение артериального давления.

Из-за содержания эхинацеи существует повышенный риск аллергических реакций у пациентов с атопией.

Использование лекарств, содержащих эхинацею, в единичных случаях связано с возникновением аутоиммунных заболеваний. При длительном применении (более 8 недель) лекарственного средства, содержащего эхинацею, в единичном случае наблюдалось уменьшение количества лейкоцитов.

Препарат содержит лактозу и пшеничный крахмал. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы не должны принимать этот лекарственный препарат. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, и поэтому считается безопасным для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не должны принимать этот лекарственный препарат.

Требуется консультация врача, если возникают следующие симптомы:

- отек лица, жар или сильная головная боль;
- острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения;
- возникают дополнительные жалобы.

Применение во время беременности и в период кормления грудью

Препарат следует принимать во время беременности и кормления грудью только с учетом оценки соотношения пользы и риска.

Пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием этого лекарственного средства.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.

Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Неизвестно. В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Примечание: на действие гомеопатических лекарственных препаратов могут отрицательно влиять негативные факторы жизненных привычек такие как курение и употребление алкоголя.

Режим дозирования и способ применения

Всегда следуйте указаниям данной инструкции или Вашего врача, или фармацевта. Если Вы не уверены в правильном применении препарата проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Режим дозирования:

Взрослые: при острых состояниях принимают по 1 таблетке каждый час (максимум до 12 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Дети

Дети в возрасте от 2 до 5 лет: при острых состояниях принимают по 1 таблетке 3 раза в день до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте от 6 до 11 лет: при острых состояниях принимают по 1 таблетке каждые два часа (максимум до 6 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети в возрасте 12 лет и старше: при острых состояниях принимают по 1 таблетке в час (максимум до 12 таблеток в день) до наступления улучшения. Для последующего лечения принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

При *хронических состояниях* детям и взрослым принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Рекомендуется продолжать лечение от 4 до 6 недель.

Синосан А не рекомендуется принимать свыше 4 недель, не проконсультировавшись с врачом.

Способ применения

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Маленьким детям рекомендуется растворить таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Побочные реакции

Очень редко (<1/10000) или с неизвестной частотой (частота не может быть оценена из имеющихся данных):

После приема Синосан А могут возникнуть реакции гиперчувствительности, например, кожные высыпания и желудочно-кишечные расстройства. В этих случаях прием препарата следует прекратить и принять соответствующие меры лечения.

Если появляется повышенное слюноотделение, дозировка должна быть уменьшена или лечение прекращено.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Примечание: существующие жалобы могут временно ухудшиться при приеме гомеопатических лекарств (начальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациентам рекомендуется прекратить прием лекарств и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Не установлена.

Упаковка

20 таблеток в блистере. 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению в упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ.,
Штайнфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Владелец РУ

Альпен Фарма ГмбХ
Штайнфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах,
Германия

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «France Pharma»

Республика Узбекистан, 100041, г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Навнихол 86

Тел.: +99871 2309193

E-mail: infopharmaff@gmail.com